


کد سند: MHWI-IC-01	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی استاد مطهری عنوان سند: دستورالعمل	
ویرایش: اول		
تاریخ ابلاغ: آذرماه ۹۸		
تاریخ بازنگری: سالانه		

عنوان دستورالعمل: "استواردشیپ بیمارستانی"	دامنه: بیمارستان
---	------------------

صاحبان فرایند و ذینفعان:

بیماران / پرسنل / پزشکان

فرد پاسخگو:

مسئول فنی / ایمنی، سوپروایزر کنترل عفونت، روسا و سرپرستاران بخش های بالینی

تعاریف:

surgical site infection: عفونت محل عمل جراحی که شامل عفونت انسزیون، عفونت عضو و عفونت سایر

اعضاء و مکان های دستکاری شده حین عمل می باشد.

آنتی بیوتیک پروفیلاکسی: استفاده از آنتی بیوتیک در درمان بیماران و پروفیلاکسی قبل از اعمال جراحی

شیوه انجام کار:

از آنجایی که عفونت محل عمل عمده موربیدیتی عفونی در بیماران جراحی به حساب می آید و استفاده از

آنتی بیوتیک ها پیش از اعمال جراحی در صورت اندیکاسیون و طبق دستور پزشک معالج، جزو اصلی مراقبت


استاندارد در اکثر اعمال جراحی به شمار می رود که منجر به کاهش میزان بروز عفونتهای پس از عمل می

گردد، لذا این مرکز دستورالعمل را با تأکید بر اجرای صحیح پروتکل آنتی بیوتیک پروفیلاکسی (در سرویس

زنان) و جلوگیری از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها تدوین نموده است.

۱ سوپروایزر کنترل عفونت با همکاری واحد آموزش نسبت به آموزش پرسنل در زمینه عفونت های بیمارستانی

، مقاومت های میکروبی، مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها و ... اقدام می کند.

کد سند: MHWI-IC-01	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی استاد مطهری عنوان سند: دستورالعمل	
ویرایش: اول		
تاریخ ابلاغ: آذرماه ۹۸		
تاریخ بازنگری: سالانه		

۲. تیم کنترل عفونت با هماهنگی آزمایشگاه نسبت به بررسی حساسیت و مقاومت جرم های جدا شده از نمونه های کشت مربوط به بیماران اقدام می کند .

۳. واحد آزمایشگاه الگوهای مقاومت غیر طبیعی مانند استافیلو کوک اورئوس به متی سیلین و وانکومايسين را به واحد کنترل عفونت گزارش می کند.

۴. تیم کنترل عفونت با همکاری و استفاده از نظرات پزشکان متخصص زنان پروتکل استفاده از داروهای پروفیلاکسی قبل عمل را تدوین و به کلیه بخش ها ابلاغ می کند .

۵. تیم کنترل عفونت الگوی مقاومت میکروبی و الگوی مصرف آنتی بیوتیک ها و تجزیه و تحلیل مربوط به آن ها را به کمیته کنترل عفونت ارسال می کند .


۶. مسئول داروخانه بستری و دبیر کمیته دارو مصرف میزان آنتی بیوتیک های پر مصرف را به صورت ۶ ماهه به کمیته کنترل عفونت می دهد تا کمیته با توجه به عفونت های شایع مرکز (عفونت ادراری) و الگوی مقاومت میکروبی گزارش شده توسط آزمایشگاه، تصمیماتی در خصوص نحوه مصرف یک یا چند آنتی بیوتیک اتخاذ نموده و نتیجه را به اطلاع بخش می رساند .

۷. در خصوص پروتکل آنتی بیوتیک پروفیلاکسی بعد از نظر خواهی از جراح زنان و پزشکان بی هوشی و استفاده از دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده شماره ۸ ، نحوه تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکسی به صورت زیر تدوین گردید:

❖ در اعمال زنان و مامایی مانند هیستریکتومی دوگرم سفازولین ۲ گرم ۳۰-۴۵ دقیقه قبل از عمل (در

صورت شک به عفونت هوازی به علاوه آن مترونیدازول ۵۰۰ میلی گرم)

❖ در سزارین سفازولین ۲ گرم ۳۰-۴۵ دقیقه قبل از عمل در صورت پر خطر بودن ۲ گرم

کد سند: MHWI-IC-01	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی استاد مطهری عنوان سند: دستورالعمل	
ویرایش: اول		
تاریخ ابلاغ: آذرماه ۹۸		
تاریخ بازنگری: سالانه		

نحوه نظارت بر اجرا:

چک لیست اختصاصی کنترل عفونت بخش ها

۲. نرم افزار INIS

۳. فرم بیماریابی عفونتهای مرتبط با مراقبت های بهداشتی

منابع/مراجع:

۱. راهنمای کشوری نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی / حسین معصومی اصل ۱۳۸۶

۲. دستورالعمل مراقبت های مدیریت شده شماره ۸ وزارت بهداشت ۱۳۸۳

سمت	ابلاغ کننده:	تایید کننده:	سمت	تهیه کننده:
ریاست	عبدالوهاب رحمانیان	کمیته پیشگیری و کنترل عفونت	متخصص عفونی سوپروایزر کنترل عفونت سوپروایزر آموزشی مسئول فنی داروخانه سرپرستار آزمایشگاه	حشمت اله شاکری نرجس کشایی معصومه رحیمی نیکتا زبردست شاهدخت رجبی